

Le Poppers

S'INFORMER POUR EVITER LE PIRE

S'INFORMER POUR EVITER LE PIRE



A HA' API'I EI ARAIRA' A'I TE 'A'I RAHI

Te Poppers

A HA' API'I EI ARAIRA' A'I TE 'A'I RAHI



E aha teie mea ?

E 'itehia te "poppers" i roto i tōna fa'ananahora'a huero, e aore ra e mōhina pape rā'au māre'are'a. Mea hāmanihia o ia e te mau mea nō roto mai i te "nitrite" e, e ho'ohia i n'ia i te i'oa o te "Rush", "Jolt", "Locker room", "Jack Hammer" ...

E rā'au fa'a'a'ano uaua toto teie o te fa'a'ohipahia nō te rapa'au i vetahi mau māi mafatu, ua 'ōpēnīhia ra tōna fa'a'ohipara'a i te fenua Farāni i muri mai i te pohera'a vetahi mau ta'ata pupuhi 'ava'ava ta'ero (Vea a te Hau nō te 28/03/90).

Teie huru fa'a'ohipara'a 'ino o teie rā'au, tē 'itehia nei i roto i te mau taimē 'areareara'a, te mau fare 'areareara'a, te mau fare toa ho'o ve'a nō te tino vaihaha'a... nō tāna huru fa'aitoito i te tino e te fa'auruā i te ta'ata.

Mea nā hea o ia ia ,ohipa ?

E huthia te « poppers » nā roto i te 'apo'o ihu. E tae 'oi'oi tāna au i roto roa i te toto nā roto atu i te mahāhā, e 'ohipa atu ai i roto i te roro, te ate, e te mafatu. Mea nā roto i te mahāhā ato'a teie rā'au e tūra'ihia ai i rapae.



Qu'est-ce que c'est ?

Les poppers se présente en ampoule ou en flacon contenant un liquide volatile translucide teinté de jaune. Il est fabriqué à partir de différents dérivés de nitrites (acides riches en azote) et est vendu le plus souvent sous le nom de "Rush", "Jolt", "Locker room", "Jack hammer" ...

C'est un vasodilatateur qui a été utilisé pour soigner certaines maladies cardiaques mais a été interdit en France à la suite d'intoxications mortelles (J.O. du 28/03/90).

Son usage détourné s'est surtout répandu dans les milieux festifs, boîtes de nuit, sex-shops... pour sa réputation euphorisante et aphrodisiaque.

Comment agit-il ?

Le poppers est sniffé (respiré). Ses vapeurs gagnent rapidement le sang par les poumons agissant ainsi sur le cerveau, le foie et le cœur. L'élimination du produit actif se fait principalement par les poumons.



Te mea o tāna e fa'atupu

I te taimē raverā :

E ha'ūti teie rāau i tāna raverā fa'ataravana e fa'āurumāmāa i muri rīi noa mai i te hūtrā, e taimē potō nda ra (eita e hau atu i hūtrā, e hina'aro noa te tāata te 2 miniti). Nō reira, e hina'aro noa te tāata rave i te hūti i teie rāau, e rahi atu ā ia te āti o tā teie rāau e riro i te fa'atupu mai.

I muri mai i te hūtrāhia teie rāau, e pa'apāa i 'apō ihu, te 'apō tarā e aore ra te 'arapō. I te mea ua 'ano te tāto'arā o te mau uaua toto, e topa tāue ia te neirā o te toto. E fa'atāniti o ia i te upō, e 'ornimīti te tino, e tae roa i te matapourā, e tūpāpāi pūi te mafā, e māi tūpāi te upō, e hina'aro pihāe, e māiui rahi te mata.

Nō te fīi o te tērerā o te toto i te mau uaua, e riro te tāata i rave i taua rāau ra i te pohe i muri mai i te paura te aho, e aore ra te tīrā te mata i rōto i te mau uaua.

I te mau taimē rave-tāmau-rā :

Mea rahi te fīi e riro i te fa'aruruhia e te mau tāata e rave tāmau i taua rāau ra, ia 'te āe tātoū i te fīi pohe e riro i te fa'aruruhia i muri mai i te raverā i te hō'e noa taimē. Vetahi taimē e māiui pūi rahi te upō, e vai noa o ia, e tae atu i te tūpāpāi rā huru ē o te mafā (e riro te mafā i te fa'aea tāue noa). E fa'atupu mai te ne'i-pūai-rā o te toto e te iti-rā-hā o te toto, e te rā-hā i te rōhīrōhi rahi e te māiui o te ha'afīi i te orarā o te tāata i rave i taua rāau ra.

Ses effets

Immédiats :

Les effets euphorisants et stimulants sont obtenus immédiatement après l'inhalation mais sont très brefs (ne dépassant pas 2 minutes).

C'est pourquoi l'utilisateur est tenté d'en reprendre, ce qui augmente les dangers liés au produit.

L'inhalation du produit engendre des brûlures nasales, oculaires ou pharyngées.

La vasodilatation généralisée entraîne une chute rapide de la pression artérielle.

Elle est à l'origine d'étourdissements voire de syncopes (risques de chute...), de palpitations, de maux de tête, nausées et problèmes oculaires douloureux.

Les troubles de la circulation sanguine peuvent conduire au décès de l'utilisateur par asphyxie ou par hypoxie (manque d'oxygène des organes).

Lors d'usages répétés :

Les dangers encourus par les usagers réguliers sont considérables quant on sait que l'on peut mourir avec une prise unique. Les maux de tête se révélant parfois très violents persistent de même que les troubles cardiaques (risque d'infarctus).

L'hypotension artérielle et une anémie grave créent une grande fatigue générale et des malaises qui mettent la vie de l'utilisateur en danger.

Te mātaura'a te tino e te rave-tāmau-ra'a.

Nō te hina'aro i te ora i te tahi mau mea fa'ahiahia e te au rahi i vai tāpī'i noa ai te ferunira'a o te ta'ata 'amu i ni'a i teie rā'au « poppers », e i reirara'a ihoā o ia e 'ohipa ai nō te tahi taima potō noa rā. E mā'aro 'o'ioi noa atō'a te tino i teie huru rā'au, nō reira i hina'aro noa ai i te 'amu i taua rā'au ra.

Noa atu e mea varavara teie rā'au i te fa'a'ohipahia , e fīi rahi rā tāna e fa'atupu mai, e tae roa te ta'ata i te pohe. Hau atu i te 300 ta'ata tei pohe i te fenua Farāni i roto i te roara'a e 18 matahiti.



A fārerai atu :

- I tō 'outou taote rapa'au

- Te Piha 'ohipa rapa'aura'a i te ta'ero 'ava e te ta'ero 'ava'ava o tē horo'a mai i te mau ha'amāramaramara'a e tae atu i tāna ta'aturu.

Niuniu : (689) 46 00 67

Email : sat@sante.gov.pf

Fa'atenerā'a o te Ea. Piha fa'atere hau ha'apā'o i te Ea Tahua 'itenati : www.drogue-polynesie.com

Accoutumance et dépendance

La recherche de sensations rapides et intenses explique la grande dépendance psychologique de l'usager au poppers dont l'action est quasi immédiate mais de très courte durée. La tolérance au produit s'installe rapidement et nécessite de multiplier les prises pour obtenir le même effet.

Bien que généralement utilisé de manière occasionnelle, le poppers fait courir des risques non négligeables voire mortels. Plus de 300 décès ont déjà été recensés en France en une vingtaine d'année.



Vous pouvez consulter :

Votre médecin traitant ou Le Centre de consultations spécialisées en alcoolologie et toxicomanie qui peut vous apporter des informations ainsi que son soutien.

Tél : (689) 46 00 67

Email : sat@sante.gov.pf

Direction de la Santé. Ministère chargé de la Santé

Site web : www.drogue-polynesie.com