

## Qu'est-ce que c'est ?

Le poppers se présente en ampoule ou en flacon contenant un liquide volatil translucide teinté de jaune. Il est fabriqué à partir de différents dérivés de nitrites (acides riches en azote) et est vendu le plus souvent sous le nom de "Rush", "Jolt", "Locker room", "Jack hammer"...

C'est un vasodilatateur qui a été utilisé pour soigner certaines maladies cardiaques mais a été interdit en France à la suite d'intoxications mortelles (J.O. du 28/03/90).

Son usage détourné s'est surtout répandu dans les milieux festifs, boîtes de nuit, sex-shops... pour sa réputation euphorisante et aphrodisiaque.

## Comment agit-il ?

Le poppers est sniffé (respiré). Ses vapeurs gagnent rapidement le sang par les poumons agissant ainsi sur le cerveau, le foie et le cœur. L'élimination du produit actif se fait principalement par les poumons.



E hutihia te « poppers » nā roto i te 'apo'o ihu. E tae 'oi tana au i roto roa i te toto nā roto atu i te mahahā, e 'ohipa atu ai i roto i te roro, te ate, e te mafabu. Mea nā roto i te mahahā ato'a teie rā au e tōrahia ai i rapae.

## Mea nā hea o ia ia 'ohipa ?

E rāu fā'ānau uaua toto teie o te fā'ohipahia nō te rapāu i vetahi mau māi mafabu, ua ōpā-nihia ra tōna fā'ohipara i te fanua Farani i muri māi i te pohera vetahi mau tāta pupuhi, 'ava'ava tāero (Vea a te Hau nō te 28/03/90). Teie huru fā'ohipara 'ino o teie rā au, tē 'itehia nei i roto i te mau taima 'areareara, te mau fare 'areareara, te mau fare toa ho'ova nō te tino e te fā'auruā i te tāta.

E 'itehia te "poppers" i roto i tōna fānāhorā hūero, e aore ra e mōhina pape rā au māre'are'a. Mea hāmanihia o ia e te mau mea nō roto māi i te "nitrite" e, e ho'ohia i nī'a i te 'oa o te "Rush", "Jolt", "Locker room", "Jack Hammer"...

## E aha teie mea ?

# Le Poppers

S'INFORMER POUR EVITER LE PIRE

S'INFORMER POUR EVITER LE PIRE



A HA' API'I EI ARAIRA' A'I TE 'ATI RAHI

# Te Poppers

A HA' API'I EI ARAIRA' A'I TE 'ATI RAHI

# Accoutumance et dépendance

La recherche de sensations rapides et intenses explique la grande dépendance psychologique de l'utilisateur au poppers dont l'action est quasi immédiate mais de très courte durée. La tolérance au produit s'installe rapidement et nécessite de multiplier les prises pour obtenir le même effet.

Bien que généralement utilisé de manière occasionnelle, le poppers fait courir des risques non négligeables voire mortels. Plus de 300 décès ont déjà été recensés en France en une vingtaine d'années.



## Vous pouvez consulter :

Votre médecin traitant ou Le Centre de consultations spécialisées en alcoolologie et toxicomanie qui peut vous apporter des informations ainsi que son soutien.

**Tél : (689) 46 00 67**

Email : [sat@sante.gov.pf](mailto:sat@sante.gov.pf)

Direction de la Santé, Ministère chargé de la Santé

Site web : [www.drogue-polynesie.com](http://www.drogue-polynesie.com)

# Te mataurā'a te tino e te rave-tāmau-ra'a.

No te hina'aro i te ora i te tahi mau mea fa'ahia hia e te au rahi i vai tāpiti noa ai te ferururā'a o te tātata 'amu i nira i teie rāau « poppers », e i reira'a ihō'a o ia e 'ohipa ai nō te tahi taima potō noa ra. E mā'aro 'oi noa atō'a te tino i teie huru rāau, nō reira i hina'aro noa ai i te 'amu i tāua rāau ra.

Noa atu e mea varavara teie rāau i te fa'ahipahia , e fifi rahi rā tana e fa'atupu mai, e tae roa te tātata i te pohe. Hau atu i te 300 tātata tei pohe i te fenua Farāni i foto i te roara'a e 18 matahiti.



## A Farerei atu :

- I tō 'outou taote rapa'au

- Te Piha 'ohipa rapa'aura i te ta'ero 'ava e te ta'ero 'ava o tē hon'a mai i te mau ha'amā'araramarara e tae atu i tāna tā'uru.

**Niuniu : (689) 46 00 67**

Email : [sat@sante.gov.pf](mailto:sat@sante.gov.pf)

Fataterera o te Ea. Piha fatatere hau hapā'o i te Ea

Tahua 'itenati : [www.drogue-polynesie.com](http://www.drogue-polynesie.com)

## Te mea o tana e fa'atupu

I te taima raverā'a :

E ha'uiti tele rā'au i tana raverā'a fa'ataravana e te fa'aunamā'ama'a i muri r'i' noa mai i te hū'irā'a, e taima potō nōa ra (e'ita e hau atu i te 2 miniti). Nō reira, e hina'aro noa te tā'ata rave i te hū'i i tele rā'au, e rahi atu ā ia te 'ati o tā tele rā'au e riro i te fa'atupu mai.

I muri mai i te hū'irā'ahia tele rā'au, e pa'apā'a te 'apō'o ihu, te 'apō'o tārā'a e aore ra te 'arapō'a. I te mea ua 'a'ano te tā'otarā'a o te mau naua toto, e topa tā'ue ia te nei'rā'a o te toto. E fa'atāniti'o o ia i te upō'o, e 'omii'mi'i te tino, e tae noa i te matapounrā'a, e tūpā'ipā'i pū'i te mafatu, e mā'i tūpā'i te upō'o, e hina'aro pihā'e, e mā'iui rahi te mata.

Nō te fifi o te tere'rā'a o te toto i te mau naua, e riro te tā'ata i rave i taua rā'au ra i te pō'he i muri mai i te paura te aho, e aore ra te tū'rā'a te mata'i i toto i te mau naua.

I te mau taima rave-tāmau-rā'a :

Mea rahi te fifi e riro i te fa'aruru'hia e te mau tā'ata e rave tāmau i taua rā'au ra, ia 'ite ā'e tā'tou i te fifi pō'he e riro i te fa'aruru'hia i muri mai i te raverā'a i te hō'e noa taima. Vetahi taima e mā'iui pū'i rahi te upō'o, e vai noa o ia, e tae atu i te tūpā'ipā'rā'a hū'uru e o te mafatu (e riro te mafatu i te fa'āea tā'ue noa). E fa'atupu mai te nei-pū'arā'a o te toto e te iti-rā'hira'a o te toto, utē'ute i te rohio'hi rahi e te mā'iui o te ha'afifi i te orarā'a o te tā'ata i rave i taua rā'au ra.

## Ses effets

### Immédiats :

Les effets euphorisants et stimulants sont obtenus immédiatement après l'inhalation mais sont très brefs (ne dépassant pas 2 minutes).

C'est pourquoi l'usager est tenté d'en reprendre, ce qui augmente les dangers liés au produit.

L'inhalation du produit engendre des brûlures nasales, oculaires ou pharyngées.

La vasodilatation généralisée entraîne une chute rapide de la pression artérielle.

Elle est à l'origine d'étourdissements voire de syncopes (risques de chute...), de palpitations, de maux de tête, nausées et problèmes oculaires douloureux.

Les troubles de la circulation sanguine peuvent conduire au décès de l'utilisateur par asphyxie ou par hypoxie (manque d'oxygène des organes).

### Lors d'usages répétés :

Les dangers encourus par les usagers réguliers sont considérables quant on sait que l'on peut mourir avec une prise unique. Les maux de tête se révélant parfois très violents persistent de même que les troubles cardiaques (risque d'infarctus).

L'hypotension artérielle et une anémie grave créent une grande fatigue générale et des malaises qui mettent la vie de l'usager en danger.